

PHACOCHÈRE D'AFRIQUE



NOM NÉERLANDAIS
Wrattenzwijn

NOM FRANÇAIS
Phacochère d'Afrique

NOM ANGLAIS
Common warthog

NOM SCIENTIFIQUE
Phacochoerus africanus

LE PHACOCHÈRE D'AFRIQUE ...

- Porte plusieurs bosses au visage, ressemblant à des verrues. Ce ne sont pas vraiment des verrues, mais des coussinets. Ceux-ci les protègent lors des combats.
- Dort dans des terriers. Il utilise les terriers creusés par d'autres animaux et y entre à reculons afin de pouvoir surveiller l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES

- Classe: Mammifères
- Ordre: Artiodactyles
- Famille: Porcins
- Longueur tête-tronc: 105 - 150 cm
- Poids: 50 - 150 kg
- Longueur de la queue: 35 - 50 cm
- Âge maximum: ±18 ans

AIRE DE RÉPARTITION

Le phacochère se rencontre en Afrique centrale et australe.

BIOTOPE

Il vit dans les prairies ouvertes, les savanes et entre les buissons.





RÉGIME ALIMENTAIRE

Le phacochère se nourrit d'herbes, de racines et de fruits.

REPRODUCTION

La gestation d'un phacochère dure 160 à 170 jours. Une portée peut comporter 1 à 8 petits.

MENACÉ

Le phacochère est considéré comme "non menacé". Il doit ce statut à sa vaste répartition et sa reproduction rapide.

EEP

L'EEP (programme européen ex-situ) est géré par le Flamingo Land Resort (RU).

